



Conoce como utilizar el servicio de hospitalización parcial en el CTIC

RECUERDA

En el CTIC no contamos con servicio de urgencias. En caso de presentar algún síntoma que requiera atención inmediata, usted debe consultar al servicio de urgencias más cercano a donde se encuentre.

¿QUÉ ES LA HOSPITALIZACIÓN PARCIAL?

Hospitalización parcial es un servicio donde **se atienden las consultas prioritarias, no urgentes, de los pacientes de CTIC**. Que tengan síntomas relacionados con su patología oncológica.

TIEMPO DE ATENCIÓN

El tiempo de espera es de **1 hora hasta 4 horas**, ya que son consultas prioritarias no urgentes.

¿CÓMO AGENDAR?

Comuníquese al call center **(601) 7448000** o llegue directamente a hospitalización parcial en el horario establecido.

¿QUIÉN ME ATIENDE?

En este servicio usted será atendido por un equipo de salud liderado por un **Médico Internista**.

¿EN QUÉ HORARIO Y DONDE?

Lunes a Viernes de **7:00 a.m. - 5:00 p.m.** En el sótano 1 hospitalización parcial.

¿CUÁNDO ACUDIR A HOSPITALIZACIÓN PARCIAL?

Usted puede consultar a este servicio cuando su enfermedad oncológica produce síntomas o molestias que **NO ponen en riesgo su vida**, como por ejemplo:

- **Dolor que persiste** a pesar de tomar medicamentos.
- **Temperatura mayor a 38** grados C.
- **Sensación leve** de dificultad para respirar.
- **Náuseas y vómito** persistente.
- **Diarrea** persistente.
- **Ausencia** de deposición.
- **Ardor o dolor** al orinar.
- **Dolor de espalda intenso**, o que se asocie con dificultad para orinar, para hacer deposición.
- **Necesidad de cambio de dispositivos médicos** como sondas, catéteres o drenajes.
- **Hinchazón** en un brazo o una pierna.
- **Disfunción de sondas o drenajes** (no drena líquido, drena líquido por paredes).

Si fue operado en el CTIC, puede consultar por:

- **Sangrado abundante** en la herida quirúrgica.
- **Sangrado abundante** por drenes o sonda.
- **Salida de pus** en la herida quirúrgica.
- **Cambios en la herida** como que se ponga roja, caliente o hinchada.
- **Dolor intenso** en el sitio de la cirugía
- **Apertura de la herida quirúrgica** (que las suturas se abran).

ACUDA AL SERVICIO URGENCIAS MÁS CERCANO

Usted debe consultar a un servicio de urgencias cuando corre en riesgo su vida, y se requiere una atención médica inmediata. **Recuerde que en el CTIC no contamos con servicio de urgencias**. Algunos síntomas por los que puede requerir atención inmediata son:

- **Dolor en el pecho** (opresión en el pecho, hombro izquierdo, mandíbula o cuello).
- **Sensación de palpitaciones** (que el corazón late fuerte y/o rápido).
- **Dificultad para respirar**.
- **Labios azules o morados**.
- **Dificultad para hablar** o entender cuando le hablan de inicio repentino.
- **Adormecimiento o debilidad de medio cuerpo** o un brazo o una pierna, de inicio repentino.
- **Parálisis de la mitad de la cara**.
- **Dolor de cabeza intenso de inicio repentino**.
- **Dificultad para ver** de inicio repentino.
- **Desmayos**.
- **Convulsiones** (movimientos incontrolables de una o varias extremidades, con pérdida del estado de conciencia, que duren más de 5 minutos u ocurran muy seguidas una después de otra).
- **Vómito o deposición negra o con sangre fresca**.
- **Golpes, caídas o accidentes**.